

BADANIE TK Z KONTRASTEM

TERMIN BADANIA:

data badania, godzina badania

Do badania Tk z kontrastem zgłaszamy się z osobą towarzyszącą !
Do badania Tk z kontrastem pacjent zgłasza się ½ godz. przed badaniem.

Przygotowanie pacjentów do badań TK

Zalecenia ogólne:

- ☐ należy zadbać o właściwe nawodnienie organizmu, 1 dzień przed planowanym badaniem należy przyjąć płyny obojętne (woda) co najmniej 1,5 litra, w dniu badania należy wypić 2-3 szklanki wody 2 godziny przed badaniem,
- ☐ na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych)
- ☐ na badanie należy zgłosić się z 1,5 litrową butelką wody mineralnej niegazowanej
- ☐ jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego popijając niewielką ilością wody niegazowanej,
- ☐ Po badaniach TK z użyciem środka kontrastowego zaleca się spożywanie dużej ilości płynów ok. 2 litrów, aby przyspieszyć usunięcie kontrastu z krwi.

Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić 24 godziny po badaniu.

Zalecenia dla osób z cukrzycą

1. Przed badaniem pacjent powinien poinformować personel medyczny o zażywanych lekach i poziomie cukru.
2. Pacjenci, obciążeni cukrzycą leczeni Insuliną nie muszą pozostać na czczo w dniu badania

Pacjenci leczenia METFORMINĄ (np. preparaty: Avamina, Etform, Formetic, Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metformin, Metifor, Metral, Siofor) w przypadku badania Tk z podaniem środka kontrastowego, powinni odstawić lek w dniu badania.

WAŻNE!! Przed kolejnym badaniem z podaniem środka kontrastowego musi upłynąć co najmniej 48 godzin.

Bezwzględny przeciwwskazaniem do wykonania badania TK jest ciąża.

- Badanie kobiet w ciąży może odbyć się tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki, za jej wiedzą i w pełni świadomą zgodą.
- U pacjentek nieprzytomnych decyzję o wykonaniu badania TK podejmuje lekarz kierujący po konsultacji z lekarzem radiologiem nadzorującym.
- pacjentki będące w ciąży powinny koniecznie o tym fakcie powiadomić lekarza radiologa przed wykonaniem badania,

W przypadku badań w obrębie głowy i szyi należy usunąć kolczyki, spinki, klamry, łańcuszki, okulary, protezy zębowe, aparaty słuchowe,

W przypadku badań klp, jamy brzusznej, kręgosłupa należy usunąć wszelkie przedmioty mogące zakłócić przebieg badania.

Pacjenci zobowiązani są do pozostawienia telefonów komórkowych poza gabinetem diagnostycznym.

Bezpośrednio przed badaniem TK pacjent powinien przynieść ze sobą:

- aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny i eGFR. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny wykonane w okresie **nie dłuższym niż 30 dni** poprzedzającym badanie TK,
- poprzednie wyniki ostatnio wykonywanych badań diagnostycznych (opis + płyta CD), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala (jeżeli są),
- dowód osobisty,
- osoby niepełnoletnie zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim i książeczką zdrowia dziecka, dziecko powyżej 16 r. ż. musi dodatkowo wyrazić pisemną zgodę na badanie.
- w przypadku badań jamy brzusznej i/lub miednicy małej 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej,
- okulary (w przypadku ich używania)- niezbędne do wypełnienia ankiety przed badaniem.

Właściwe przygotowanie gwarantuje wysoką jakość obrazu radiologicznego, co umożliwia dokładniejszą diagnozę.

Przygotowanie do badań TK jamy brzusznej:

W przypadku badań z uwzględnieniem jelit pacjent powinien zadbać o dostateczne wypróżnienie w dniu poprzedzającym badanie i w dniu badania.

- ☐ dwa dni przed planowanym badaniem należy stosować dietę lekkostrawną
- ☐ ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 6 godzin przed planowanym badaniem,
- ☐ należy zgłosić się pół godziny przed ustalonym terminem badania w celu nawodnienia. Pacjent zaczyna pić wodę w poczekalni przed wejściem do Pracowni TK.

Przygotowanie do badań TK miednicy małej:

- ☐ przygotowanie jak do badania TK jamy brzusznej + wypełniony pęcherz moczowy.
- Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa pozostaje 30 minut pod obserwacją personelu wykonującego badanie. Jeśli nie wystąpią możliwe działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki.

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z badania TK pacjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel pracowni TK

Umówiona godzina badania jest orientacyjna i może ulec zmianie ze względu na indywidualny czas poświęcony każdemu pacjentowi i sytuacji pilne.