

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PREPARATEM CLENSIA DO KOLONOSKOPII

Sposób przygotowania preparatu:

1. W litrze wody rozpuścić 2 saszetki „A” i 2 saszetki „B” i wypić tak przygotowany roztwór w ciągu ok. 1,5 godziny (1-2 godzin) w tempie ok. 250 ml co 15-20 min.
2. Odczekać 20 min.
3. Wypić dodatkowo co najmniej 1 litr klarownego płynu (np. woda, sok jabłkowy)

Godz badania	PIERWSZA DAWKA PREPARATU	DRUGA DAWKA PREPARATU
7:00	19:00	3:00
8:00	20:00	4:00
9:00	21:00	5:00
10:00	22:00	6:00
11:00	22:00	7:00
12:00	22:00	8:00
13:00	5:00	9:00
14:00	5:00	10:00
15:00	5:00	11:00
16:00	6:00	12:00
17:00	7:00	13:00

Dieta:

Na tydzień przed badaniem należy wyeliminować z diety owoce i warzywa zawierające pestki (np. pomidor, ogórek, kiwi, maliny, truskawki).

Na 3 dni przed badaniem dieta powinna być półpłynna.

Jeśli badanie jest zaplanowane w godz. 7.00 – 9.00, to w dniu poprzedzającym należy spożyć śniadanie lekkostrawne nieobfite. Po śniadaniu należy przyjmować dużo płynów jasnych, klarownych (np. sok z jabłek, z jasnych winogron).

Jeśli badanie jest zaplanowane na po południu, to w dniu poprzedzającym badanie ostatni obiad (np. w godz. 12.00 – 13.00) należy zjeść w postaci zmiksowanej zupy. Po obiedzie trzeba również pić klarowne płyny jw.

Na 5 dni przed badaniem nie można już przyjmować leków przeciwkrzepliwych oraz preparatów zawierających żelazo (należy to skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu).